

Redactioneel



Professionals zijn het vaak niet met elkaar eens wat de beste manier van behandelen is. Of over welke ‘apps’ te gebruiken. Zo bestaan er belangrijke verschillen van inzicht over hoe te helpen bij het abstinente worden of bij ontgiftiging in de eerste fase van de behandeling. *Boonstra* presenteert bijvoorbeeld een keurig uitgewerkte en in de praktijk ontwikkelde en getoetste handelwijze voor de ontgiftiging van ghb. Niet onomstreden echter is het gebruik van benzodiazepinen daarbij; tijd voor gecontroleerd onderzoek dus. Wel al met onderzoeksgegevens onderbouwen *Dijkstra en collega's* dat voor ontgiftiging van alcohol lang niet altijd klinische opname nodig is, en dat een groep er goed bij kan helpen.

(Nog) niet toe aan ontgiftiging zijn drugsgebruikers die zich aan verslavingshulpverlening weten te onttrekken. Om hen te bereiken zijn binnen de traditie van de door respondenten zelf gestuurde steekproefverzamelmethode in twee Amsterdamse projecten gegevens verzameld. Ten eerste bij basecokergebruikers, door *Houwing en collega's*, die aantonen dat we niet al die gebruikers goed in beeld hebben via de verslavingshulpverlening. Ten tweede door *Witteveen en collega*, die opiaatgebruikers interviewden die terugschrikten voor methadon-met-consequenties.

Voorts pleit *Van der Stel* in dit nummer voor humaan en zorgvuldig woordgebruik en legt *Oudejans* ten slotte uit hoe het zit met die apps.

Gerard M. Schippers